

Tabelle: Effekt von Kohlendioxid auf die Fangleistung von Biogents Fallen.
 Table: Effect of carbon dioxide on the collection rate of Biogents traps.

Anzahl der in 24h gefangenen Stechmückenweibchen.
 Number of collected female mosquitoes in 24h.

Mückenart / Mosquito species	Ohne / without CO ₂	Mit / with CO ₂	Fallenstandort, Wissenschaftler, Jahr Location / Scientist / Year
<i>Aedes albopictus</i>	114	379	Fairfax County USA, Smith & Arias, 2010
<i>Ochlerotatus (Aedes) japonicus</i>	2	4	
<i>Ochlerotatus triseratus</i>	1	30	
<i>Culex spp</i>	5	41	
<i>Aedes aegypti</i>	46	59	Manaus Brasilien, Degener & Ázara, 2009
<i>Culex spp</i>	205	1282	
<i>Ochlerotatus caspius</i>	5	1819	Alessandria, Italien, Bitzhenner, 2005
<i>Culex pipiens</i>	26	94	
<i>Culex pipiens</i>	40	250	Grieshaus/Grafenhofen Deutschland, Obermayr, 2005
<i>Ochlerotatus sticticus</i>	61	3980	
<i>Aedes vexans</i>	26	1819	
<i>Anopheles plumbeus</i>	4	90	
<i>Simuliidae</i>	0	81	
<i>Aedes albopictus</i>	29	70	Florida USA, Kline, 2005
<i>Anopheles crucians</i>	0	30	
<i>Anopheles quadrimaculatus</i>	0	31	
<i>Coquillettidia peturbans</i>	0	7	
<i>Culiseta melanura</i>	0	22	
<i>Culex erraticus</i>	8	189	
<i>Culex nigripalpus</i>	0	118	
<i>Culex quinquefasciatus</i>	3	31	
<i>Mansonia titillans</i>	0	1	
<i>Ochlerotatus atlanticus</i>	0	10	
<i>Ochlerotatus dupreei</i>	0	1	
<i>Ochlerotatus infirmatus</i>	1	115	
<i>Psorophora columbiae</i>	3	52	
<i>Psorophora ferox</i>	0	45	